


松くい虫の生態と松枯れの関連プロセス



〈ネマバスター土壌灌注薬剤量基準表〉

周囲 cm 胸高直径 樹高 m	15.7	18.8	25.1	31.4	37.7	44	47.1	50.3	56.5	62.8	69.1	75.4	78.5	81.7	88	94.2	101	107	110	113	119	126	132	138	141	145	151	157	163	170	173	176	182	189	195	201	204	207	214	220	226	233	236	239	245	251	周囲 cm 胸高直径 樹高 m
2	32	32	32	32	32	36	39	40	46	56	65	77	83																																2		
3	44	45	45	45	46	51	54	55	66	77	91	107	115	125	127	139	159	181	192	205																											3
4	56	57	57	57	58	65	70	71	82	98	115	136	146	158	161	176	202	229	244	259	276	308	343	361	366	381	410	439																			4
5	68	68	68	68	69	78	84	84	99	118	138	162	175	190	194	211	241	275	292	311	330	369	411	433	440	458	493	528	563	598																	5
6	79	79	79	79	79	91	98	98	114	136	160	189	204	221	225	245	281	319	340	361	384	430	477	503	511	532	573	613	654	695	716	735	741	780	819	858	877	897									6
7	90	90	90	90	91	103	110	112	130	155	181	214	232	250	256	279	319	362	385	410	436	487	542	570	580	603	649	695	742	788	812	835	841	885	929	973	996	1,018	1,062	1,106	1,110	1,143	1,164	1,185	1,227	1,270	7
8	99	100	100	100	101	114	123	125	145	172	203	239	258	280	285	311	356	404	430	457	487	543	604	636	647	673	725	776	828	880	905	931	938	987	1,036	1,086	1,111	1,136	1,185	1,234	1,228	1,275	1,299	1,323	1,369	1,417	8
9	110	110	110	110	111	126	135	137	161	189	224	263	284	307	314	342	391	446	473	503	536	599	666	701	712	741	798	855	912	969	1,026	1,033	1,087	1,142	1,196	1,223	1,251	1,305	1,359	1,352	1,405	1,430	1,457	1,509	1,560	9	
10	120	120	120	120	121	137	148	149	175	207	243	287	311	335	343	373	427	486	515	549	584	653	726	765	777	808	870	932	994	1,056	1,087	1,118	1,126	1,186	1,245	1,304	1,334	1,364	1,423	1,482	1,475	1,532	1,560	1,588	1,645	1,702	10
11		130	130	130	131	149	160	162	189	224	264	310	336	363	370	403	462	525	558	593	631	705	785	826	840	874	940	1,007	1,075	1,142	1,176	1,209	1,218	1,282	1,346	1,410	1,442	1,474	1,538	1,603	1,594	1,656	1,687	1,717	1,778	1,840	11
12			139	140	141	161	172	173	203	240	283	333	360	389	398	433	496	564	599	637	67																										

● ネマバスターの処理方法 ●

機械灌注处理



土壌灌水器（2MPa、圧力：20kg/cm²目安）を用い胸高直径の約2～3倍離れた、深さ15～20cmの位置に所定薬量を1穴当たり2ℓを目安に等間隔で土壌灌注する。

施用溝処理



- ① 胸高直径の約2～3倍離れた位置に深さ15～20cm、幅20cm程度の溝を掘り、所定薬量をジョウロ、柄杓などで均一に土壌注入する。
- ② 灌注後、薬液が土壌に浸透した事を確認し溝を埋め戻す。

注1) 本表は胸高直径・樹高別のネマバスター使用基準薬量 (ml) を示すもので希釈倍量に応じ、薬液調整をして下さい。

注2) ネマバスターの基準薬量は登録使用基準量をベースに材積量を加味し設定されています。登録表上の表示薬量は赤字で示しています。

注3) 本表に示す薬量を「目安」としてマツの状態に応じ、薬量調整をして下さい。

注4) 土壌の状態に応じ、土壌浸透剤の使用も可能です。

注5) 池、河川に近い場所等、直接薬剤が流入する恐れがある場所では使用を避けてください。

2006年3月現在(単位:薬量ml)